EFFETTI sul \$NC

TIPOLOGIA

DIPENDENZA

PSICO

LETTICHE

ALCOL

OPPIACEI: oppio.morfina, eroina, metadone, buprenorfina, pentazocina, etc..

BARBITURICI

BENZODIAZEPINE:valium,tavor

roipnol,halcion,xanax, en, etc...

Sì

Tranne le benzodiazepine possibile morte per **overdose** per arresto respiratorio (depressione del centro del respiro)

PSICO

ANALETTICHE

CAFFEINA NICOTINA

COCAINA: cocaina cloridrato, crack

AMFETAMINE: efedrina, MDA ed

MDMA, altre (sintetiche)

CATINONI (mefedrone)

Sì

Possibile morte per **overdose** per infarto, fibrillazione ventricolare, ipertermia

(la **caffeina** non da dipendenza ma ad alti dosaggi può essere tossica per il cuore e dare problemi di insonnia)

PSICO

DISLETTICHE

ALLUCINOGENI:LSD, mescalina, psilocibina,PCP.

CANNABINOIDI: marijuana, hashish, olio di hashish, cannabinoidi sintetici (alte concentrazioni di THC)

INALANTI

KETAMINA

GHB

TOSSICITA'

(la **cannabis** ad alti dosaggi, con uso quotidiano e per periodi prolungati può dare anche problemi di dipendenza)